

ПОМІЧНИК ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ПТИЦІ

Лікувально-профілактична схема випоювання для курчат бройлерів, індиків, каченят та гусей з добового віку

День життя	Препарат	Доза	Кратність введення
0	Трифлон (антибіотик)	1 мл на 1л води – 24години	1 день
1-5	Трифлон	1 мл на 1л води з 8:00 до 20:00	5 днів
	Міксовіт А (вітаміни)	1 мл на 1л води з 20:00 до 8:00	5 днів
7-8	Гепатонік (гепатопротектор)	1 мл на 1л води	2 дні
11-12	Міксовіт А	1 мл на 1л води	2 дні
14-15	** Солікокс (кокцидіостатик)	2 мл на 1л води	2 дні
16-17	Міксовіт А	1 мл на 1л води	2 дні
23-25	Тримікозин (антибіотик)	1 мл на 1л води	3 дні
26-27	** Солікокс (кокцидіостатик)	2 мл на 1л води	2 дні
30-32	Міксовіт А	1 мл на 1л води	3 дні
33-36	Гепатонік	1 мл на 1л води	4 дні

Всі вище описані препарати водорозчинні та використовуються пероральним методом відповідно до схеми. Препарат потрібно розводити у теплій питній воді від 20°С-25°С градусів.

****** - рекомендуємо обов'язково проводити випоювання проти кокцидіозу.

На 50 голів в період вирощування Вам будуть потрібні препарати:

До 22-х днів	С 22-х днів до 36 днів
1.Трифлон 10мл – 1шт. 2. Солікокс 10мл – 3шт. 3. Міксовіт А 10мл – 3шт. 4. Гепатонік 10мл – 1шт.	1.Тримікозин 10мл – 3шт. 2. Солікокс 10мл – 4шт. 3. Міксовіт А 10мл – 4шт. 4. Гепатонік 10мл – 5шт.

Якщо є характерні признаки, щодо не однорідного розвитку курчат після **22-х** денного віку (наприклад: відставання в живій вазі, низька однорідність, відсутність апетиту та не задовільний клінічний стан курчат) **рекомендуємо:** проводити лікувально-профілактичну випойку до 36 денного віку згідно вище указаної схеми.

Рекомендації по температурі та вологості

Вік-днів	Відносна вологість %	Температура С
0	30-50	32-33
7	40-60	29-30
14	50-60	27-28
21	50-60	24-26
28	50-65	21-23
35	50-70	19-21
42	50-70	18
49	50-70	17
56	50-70	16

Стандартна програма освітлення, що є обов'язковою для утримання курчат бройлерів.

При досягненні живої ваги 160-170г. Ви повинні вимкнути світло на 6 годин. Наприклад з 21:00 до 3:00. Світло вимикають і включають постійно в одну і ту саму годину. За 5-ть днів до забою світло поступово нарощують по 1-й годині згідно програми освітлення.

Світлова програма для курчат бройлерів

Вік (днів)	Темряви (годин)	Перемена (годин)	Іnten.світла (люкс)	Лампочка
0	0	0	20-60	75Вт
1	1	1	20-60	75Вт
160-170 г	6	5	5-10	9Вт-11Вт економка
5 днів до забою	5	1	5-10	9Вт-11Вт економка
5 днів до забою	4	1	5-10	9Вт-11Вт економка
5 днів до забою	3	1	5-10	9Вт-11Вт економка
5 днів до забою	2	1	5-10	9Вт-11Вт економка
5 днів до забою	1	1	5-10	9Вт-11Вт економка

Щільність посадки курчат не повинна перевищувати більше ніж 18 голів 1м².