



Помічник для вирощування птиці

Лікувально-профілактична схема випоювання для курчат бройлерів, індиків, каченят та гусей з добового віку

День життя	Препарат	Доза	Кратність введення
0	Трифлон (антибіотик)	1 мл на 1л води – 24години	1 день
1-5	Трифлон	1 мл на 1л води з 8:00 до 20:00	5 днів
	Міксовіт А (вітаміни)	1 мл на 1л води з 20:00 до 8:00	5 днів
7-8	Гепатонік (гепатопротектор)	1 мл на 1л води	2 дні
11-12	Міксовіт А	1 мл на 1л води	2 дні
14-15	**Солікокс (кокцидіостатик)	2 мл на 1л води	2 дні
16-17	Міксовіт А	1 мл на 1л води	2 дні
23-25	Тримікозин (антибіотик)	1 мл на 1л води	3 дні
26-27	**Солікокс (кокцидіостатик)	2 мл на 1л води	2 дні
30-32	Міксовіт А	1 мл на 1л води	3 дні
33-36	Гепатонік	1 мл на 1л води	4 дні

Всі вище описані препарати водорозчинні та використовуються пероральним методом відповідно до схеми. Препарат потрібно розводити у теплій питній воді від 20°С-25°С градусів.

На 50 голів в період вирощування Вам будуть потрібні препарати:

До 22-х днів	С 22-х днів до 36 днів
1.Трифлон 10мл – 1шт. 2. Солікокс 10мл – 3шт. 3. Міксовіт А 10мл – 3шт. 4. Гепатонік 10мл – 1шт.	1.Тримікозин 10мл – 3шт. 2. Солікокс 10мл – 4шт. 3. Міксовіт А 10мл – 4шт. 4. Гепатонік 10мл – 5шт.

Якщо є характерні признаки, щодо не однорідного розвитку курчат після **22-х** денного віку (наприклад: відставання в живій вазі, низька однорідність, відсутність апетиту та не задовільний клінічний стан курчат) **рекомендуємо:** проводити лікувально-профілактичну випойку до 36 денного віку згідно вище указаної схеми.